


SUIVI DE LA SITUATION DES ENFANTS ET DES FEMMES

MICS 5

CÔTE D'IVOIRE

Enquête par grappes à indicateurs multiples 2016



PRINCIPAUX INDICATEURS



PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ENQUÊTE MICS 5

MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE			
Plan de sondage - Base de sondage RGPH 2014 - Mise à jour : du 12 Décembre 2015-28 Février 2016		Questionnaires : - Ménage - Module Test qualité eau	
Echantillon de l'enquête - 12 800 ménages - 512 grappes (511 visitées) - 25 ménages par grappe		Formation des enquêteurs 1 ^{er} Mars-16 Avril 2016	Collecte de données à l'aide de tablettes 23 Avril-22 Juillet 2016
			Edition secondaire des données 25 juillet au 03 septembre 2016
Ménages - Echantillonnés 12 768 - Occupés 12 303 - Interrogés 11 879 - Taux de réponse : (Pour cent) 96,6		Femmes - Eligibles pour les entrevues 12463 - Interrogées 11 780 Taux de réponse : (Pour cent) 94,5	Hommes - Eligibles pour les entrevues 5 919 - Interrogés 5 405 Taux de réponse : (Pour cent) 91,3
Enfants de moins de cinq ans - Eligibles pour les entrevues 9 259 - Mères/gardiennes interrogées 9 094 - Taux de réponse (Pour cent) 98,2		Tests qualité eau - Eligibles aux tests 1 926 - Testés 1 918 - Taux de réponse (Pour cent) 99,6	

POPULATION D'ENQUÊTE			
Taille moyenne du ménage	4,6	Population dénombrée	54 352
Pourcentage de la population de moins de :		Pourcentage de la population vivant en	
- 5 ans	15,3	- Milieu de résidence urbain	47,3
- 18 ans	47,7	- Milieu de résidence rural	52,7
Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant au moins une naissance vivante au cours des 2 dernières années	28,8	- Centre	5,7
Répartition en pourcentage des chefs de ménage selon le sexe		- Centre-Est	2,2
- Féminin	17,5	- Centre-Nord	6,7
- Masculin	82,5	- Centre-Ouest	13,6
		- Nord	6,1
		- Nord-Est	4,5
		- Nord-Ouest	5,7
		- Ouest	9,7
		- Sud sans Ville d'Abidjan	13,9
		- Sud-Ouest	9,0
		- Ville d'Abidjan	22,9

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES		BIENS DES MENAGES OU PERSONNELS	
Pourcentage des ménages ayant :		Pourcentage des ménages possédant	
- Electricité (ODD 7.1.1)	64,3	- Un appareil de télévision	51,6
- Revêtement de sol fini	85,8	- Un réfrigérateur	15,7
- Toiture finie	83,1	- Une terre agricole	48,6
- Murs finis	72,3	- Des animaux de ferme/du bétail	29,4
Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir	2,44		
Pourcentage de ménages où :		Pourcentage des ménages où au moins un membre a ou possède	
- Un membre du ménage propriétaire du logement	54,7	- Au moins un téléphone portable	91,8
- Au un membre possède un compte bancaire	21,7	- Au moins une voiture ou un camion	4,8

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur	
MICS				
MORTALITE DES ENFANTS				
Mortalité des jeunes enfants*				
1.1	ODD 3.2.2	Quotient de mortalité néonatale	Probabilité de décéder dans les premiers mois de vie	33
1.2	OMD 4.2	Quotient de mortalité infantile	Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire	27
1.3		Quotient de mortalité post néonatale	Différence entre quotient de mortalité infantile et néonatale	60
1.4		Quotient de mortalité juvénile	Probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire	39
1.5	ODD 3.2.1 OMD 4.1	Quotient de mortalité des enfants moins de cinq ans	Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire	96
* Les quotients renvoient à la période de cinq ans avant l'enquête. Ils sont exprimés en pour mille				
NUTRITION				
Etat nutritionnel				
2.1a 2.1b	OMD 1.8	Prévalence insuffisance pondérale (a) Modérée et grave (b) Sévère	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans en deçà de (a) deux écarts-types (modéré et grave) (b) trois écarts-types (sévère) du poids médian pour l'âge de la norme OMS	12,8 3,1
2.2a 2.2b	ODD 2.2.1	Prévalence retard croissance (a) Modéré et grave (b) Sévère	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans en deçà de (a) deux écarts-types (modéré et grave) (b) trois écarts-types (sévère) de la taille médiane pour l'âge de la norme OMS	21,6 6,8
2.3a 2.3b	ODD 2.2.2	Prévalence émaciation (a) Modérée et grave (b) Sévère	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans en deçà de (a) deux écarts-types (modéré et grave) (b) deux écarts-types (sévère) du poids médian pour l'âge de la norme OMS	6,0 1,2
2.4	ODD 2.2.2	Prévalence surpoids	Pourcentage des enfants de moins de 5 ans se situant au-dessus de deux écarts-types du poids médian pour l'âge de la norme OMS	1,5
Allaitement et alimentation infantile				
2.5		Enfants allaités	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaité leur dernier enfant né vivant, à n'importe quel moment	97,4
2.6		Initiation précoce de l'allaitement	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier nouveau-né dans la première heure après la naissance	36,6
2.7		Allaitement exclusive des moins de 6 mois	Pourcentage de nourrissons de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités	23,5
2.8		Allaitement prédominant des moins de 6 mois	Pourcentage de nourrissons de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante d'alimentation durant le jour précédent	74,8
2.9		Allaitement continu à 1 an	Pourcentage d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	88,1
2.10		Allaitement continu à 2 ans	Pourcentage d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	29,0
2.11		Durée médiane de l'allaitement	Age en mois où 50 pour cent d'enfants de 0-35 mois allaités quel que soit le type d'allaitement	19,2

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
2.12	Allaitement approprié selon l'âge	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été nourris de façon appropriée le jour précédent l'enquête	53,2
2.13	Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous	Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous pendant le jour précédent l'enquête	65,5
2.14	Fréquence des repas lactés pour les enfants non allaités	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent l'enquête	18,6
2.15	Fréquence minimum des repas	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent l'enquête	47,7
2.16	Diversité minimum alimentaire	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments durant le jour précédent l'enquête	26,0
2.17a	Régime alimentaire minimum acceptable	(a) Pourcentage d'enfants de 6-23 mois allaités qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent l'enquête	14,3
2.17b		(b) Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés et qui ont reçu la diversité alimentaire minimum, lait non inclus et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent l'enquête	6,7
2.18	Alimentation au biberon	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent l'enquête	6,0
Iodation du sel			
2.19	Consommation de sel iodé	Pourcentage de ménages avec du sel testé à 15 parts par million ou plus d'iodate	67,3
Insuffisance pondérale à la naissance			
2.20	Nourrissons de faible poids à la naissance	Pourcentage de dernières naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui pèsent moins de 2500g à la naissance	16,7
2.21	Nourrissons pesés à la naissance	Pourcentage de dernières naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance	75,5
SANTÉ DE L'ENFANT			
Vaccinations			
3.1	Couverture vaccinale contre la tuberculose	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu le vaccin BCG avant leur premier anniversaire	78,3
3.2	Couverture vaccinale contre la poliomyélite	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu la troisième dose de vaccin VPO (VOP3) avant leur premier anniversaire	61,1
3.3	Couverture vaccinale contre le DCTCoq, l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae type B (Hib)/(Penta)	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu la troisième dose de vaccin du vaccin Penta (Penta 3) avant leur premier anniversaire	65,9
3.4	OMD 4.3 Couverture vaccinale contre la rougeole	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu le vaccin contre la rougeole avant leur premier anniversaire	51,8
3.S1	Couverture vaccinale de la pneumonie ou de la méningite à pneumocoque (PCV-13)	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin contre la pneumonie ou la méningite à pneumocoque (PCV-13_3) avant leur premier anniversaire	46,3

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur	
MICS				
3.S2	Couverture vaccinale de la diarrhée (ROTATEQ)	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin contre la diarrhée (Rotateq_3) avant leur premier anniversaire	16,3	
3.8	Couverture vaccinale complète	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu toutes les vaccinations recommandées par le programme national de vaccination avant leur premier anniversaire	32,5	
Vaccin antitétanique				
3.9	Protection néonatale contre le tétanos	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant donné naissance à un enfant vivant au cours des 2 dernières années et ayant reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle approprié avant la naissance la plus récente	65,7	
Diarrhée				
-	Enfants souffrant de diarrhée	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines	15,2	
3.10	Recours à des soins pour diarrhée	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines pour qui des conseils ou des traitements ont été recherchés auprès d'une structure ou d'un prestataire de soins de santé	32,2	
3.11	Traitement de la diarrhée avec des sels de réhydratation orale (SRO) et du zinc	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines et reçu des SRO ou du zinc	5,6	
3.12	Traitement de la diarrhée avec des sels de réhydratation orale (SRO) et une alimentation continue	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines et reçu des SRO (paquet de SRO, liquide SRO préemballé, liquide maison recommandé ou quantité accrue de fluides) et une alimentation continue durant l'épisode de diarrhée	43,0	
Symptômes d'une infection respiratoire aiguë (IRA)				
-	Enfants présentant des symptômes d'IRA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 dernières semaines	1,3	
3.13	Recours à des soins pour les enfants ayant des symptômes d'IRA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 dernières semaines pour qui des conseils ou des traitements ont été recherchés auprès de structures ou de prestataires de soins de santé	44,0	
3.14	Antibiothérapie des enfants ayant des symptômes d'IRA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 dernières semaines et reçu des antibiotiques	30,1	
Utilisation de combustibles solides				
3.15	Utilisation de combustibles solides pour la cuisine	Pourcentage de membres des ménages dans le foyer utilisant des combustibles solides comme source primaire d'énergie domestique pour cuisiner	71,3	
Paludisme / Fièvre				
-	Enfants souffrant de fièvre	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines	26,7	
3.16a	Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) dans le ménage	Pourcentage de ménages ayant (a) au moins une MII	75,8	
3.16b		(b) au moins une MII pour chaque deux personnes	47,3	
3.18	OMD 6.7	Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII	Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII la nuit précédente	59,7
3.19		Population ayant dormi sous une MII	Pourcentage de membres des ménages ayant dormi sous une MII la nuit précédente	50,5
3.20		Recours à des soins pour la fièvre	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et pour qui des	45,2

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
		conseils ou un traitement ont été recherchés auprès d'une structure ou d'un prestataire de santé	
3.21	Usage de diagnostics du paludisme	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et eu une piqûre au doigt ou au talon pour diagnostiquer le paludisme	26,3
3.22	OMD 6.8 Traitement antipaludique des enfants moins de 5 ans	Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et reçu des traitements antipaludéens	18,1
3.23	Combinaison Thérapeutique à base à base d'Artémisinine (CTA) chez les enfants ayant reçu un traitement antipaludéen	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et reçu de la CTA (ou autre traitement de première ligne selon la politique nationale)	64,1
3.24	Femmes enceintes ayant dormi sous une MII	Pourcentage de femmes enceintes ayant dormi sous une MII la nuit précédente	53,4
3.25	Traitement préventif intermittent du paludisme durant la grossesse	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant reçu trois ou plusieurs doses de SP/Fansidar, dont l'une au moins a été reçue durant un examen de santé prénatal, afin de prévenir le paludisme au cours de leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante au cours des 2 dernières années	22,6
EAU ET ASSAINISSEMENT			
4.1	ODD 6.1.1 OMD 7.8 Utilisation de source améliorée d'eau potable	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources améliorées d'eau potable	80,7
4.2	Traitement de l'eau	Pourcentage de membres des ménages au foyer utilisant de l'eau non améliorée mais employant une méthode appropriée de traitement de l'eau	8,9
4.3	OMD 7.9 Utilisation d'installations sanitaires améliorées	Pourcentage de membres des ménages utilisant des installations sanitaires améliorées non partagées	31,5
4.4	Elimination sans danger des matières fécales de l'enfant	Pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les dernières selles ont été évacuées sans danger	54,4
4.5	ODD 6.2.1 Endroit pour le lavage des mains	Pourcentage de ménages disposant d'un endroit précis pour le lavage des mains où l'eau et le savon ou d'autres produits de nettoyage sont présents	41,0
4.6	Disponibilité de savon ou autre produit de nettoyage	Pourcentage de ménages disposant de savon et d'autres produits de nettoyage	57,4
4.S1	Qualité de l'eau de boisson dans les ménages	Pourcentage de membres de ménage consommant de l'eau dans le ménage contaminée par les <i>E. Coli</i> dans l'eau de boisson du ménage	78,5
4.S2	Qualité de la source d'eau de boisson des ménages	Proportion des membres du ménage avec des <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson	53,6
SANTE DE LA REPRODUCTION			
Contraception et besoins non satisfaits			
-	Indice synthétique de fécondité	Nombre d'enfants que mettrait au monde une femme à la fin de sa vie reproductive si, à chaque âge elle devait connaître la fécondité observée durant l'année considérée	4,6
-	Taux brut de natalité	Rapport des naissances vivantes une année donnée à la population moyenne de cette même année, exprimés pour 1000 individus	35,1
-	Taux global de fécondité générale	Taux de fécondité des femmes âgées de 15-49 ans, exprimés pour 1000 femmes de 15-49 ans	154,7
5.1	OMD 5.4 Taux de fécondité des adolescentes	Taux de fécondité par âge spécifique aux femmes âgées de 15-19 ans	124

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur	
MICS				
5.2	Grossesse précoce	Pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant eu au moins une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	25,4	
5.3	OMD 5.3	Taux de prévalence contraceptive	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans actuellement mariées utilisant (ou dont le partenaire utilise) une méthode contraceptive (moderne ou traditionnelle)	15,5
5.4	OMD 5.6	Besoins non satisfaits	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans actuellement mariées qui sont fécondes et voulant espacer leurs naissances ou limiter le nombre d'enfants qu'elles ont et qui n'utilisent pas actuellement de contraceptif	30,5
Santé maternelle et du nouveau-né				
5.5a	OMD 5.5	Couverture des soins prénatals	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et ayant été assistées durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante	93,2
5.5b	OMD 5.5			
5.6		Contenu des soins prénatals	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années, dont la pression artérielle a été mesurée et qui ont donné des échantillons d'urine et de sang au cours de la grossesse ayant abouti à une naissance vivante	76,5
5.7	ODD 3.1.2 OMD 5.2	Personnel qualifié à l'accouchement	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et qui ont été assistées par un personnel de santé qualifié au cours de leur naissance vivante la plus récente	73,6
5.8		Accouchement dans un établissement sanitaire	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et dont l'accouchement le plus récent de l'enfant né vivant a eu lieu dans une structure de santé	69,8
5.9		Césarienne	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans dont l'accouchement le plus récent de l'enfant né vivant au cours des dernières s'est fait par césarienne	3,3
Examens de santé post-natals				
5.10		Séjour post-partum dans une structure de santé	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui sont restées dans la structure de santé pendant 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récent enfant né vivant au cours des 2 dernières années	44,4
5.11		Examen de santé post-natal du nouveau-né	Pourcentage des dernières naissances vivantes au cours des 2 dernières années ayant subi un examen de santé pendant leur séjour dans une structure de santé ou à domicile après l'accouchement, ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours ayant suivi l'accouchement	83,1
5.12		Examen de santé post-natal de la mère	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant subi un examen de santé pendant leur séjour dans une structure ou à domicile après l'accouchement, ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours suivant l'accouchement de leur plus récent enfant né vivant au cours des 2 dernières années	80,3

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur	
MICS				
Fistules obstétricales				
-	-	Connaissance des fistules	Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de fistules	28,9
-	-	Prévalence des fistules	Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de fistules et qui ont déclaré avoir eu des fistules	2,5
DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT				
6.1		Fréquentation des structures d'éducation de la petite enfance	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois qui suivent un programme d'éducation pour la petite enfance	14,3
6.2		Soutien à l'apprentissage	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois avec qui un adulte s'est adonné à quatre ou plusieurs activités pour promouvoir l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des 3 derniers jours	28,7
6.3		Appui du père à l'apprentissage	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois dont le père biologique s'est adonné à quatre ou plusieurs activités pour promouvoir l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des 3 derniers jours	4,9
6.4		Appui de la mère à l'apprentissage	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois dont la mère biologique s'est adonné à quatre ou plusieurs activités pour promouvoir l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des 3 derniers jours	12,8
6.5		Disponibilité de livres pour enfants	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant trois ou plusieurs livres pour enfants	1,3
6.6		Disponibilité de jouets	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec deux ou plusieurs types de jouets	45,0
6.7		Garde inadéquate	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou confiés à la garde d'un autre enfant âgé de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au moins une fois au cours de la semaine passée	19,9
6.8		Indice de développement du jeune enfant	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie au plan du développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture/calcul, physique, socio-affectif, et apprentissage	62,8
ALPHABETISATION ET EDUCATION				
7.1	ODM 2.3	Taux d'alphabétisation des jeunes	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans qui peuvent lire un texte court et simple sur la vie de tous les jours ou qui ont suivi l'enseignement secondaire ou supérieur (a) Femmes (b) Hommes	47,2 63,8
7.2		Préparation à l'école	Pourcentage d'enfants en première année du primaire ayant fréquenté le préscolaire durant l'année scolaire précédente	16,4
7.3		Taux net d'admission à l'éducation primaire	Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école qui entrent en première année du primaire	57,1
7.4	ODD4.1.1a OMD 2.1	Taux net de scolarisation au primaire (ajusté)	Pourcentage d'enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire fréquentant actuellement l'école primaire ou secondaire	76,8
7.5	ODD4.1.1c	Taux net de scolarisation au secondaire (ajusté)	Pourcentage d'enfants en âge d'être scolarisés dans le secondaire fréquentant actuellement le secondaire ou le supérieur	40,6
7.6	ODD4.1.1b OMD 2.2	Enfants atteignant la dernière classe du primaire	Pourcentage d'enfants entrant en première année du primaire et qui finissent par atteindre la dernière année du primaire	92,6

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
7.7	Taux d'achèvement du primaire	Nombre d'enfants étant en dernière année du primaire (redoublants exclus) divisé par le nombre d'enfants du primaire ayant atteint l'âge de la fin du cycle primaire (âge approprié à l'année finale du cycle primaire)	83,6
7.8	Taux de transition à l'école secondaire	Nombre d'enfants fréquentant la dernière année de l'école primaire durant l'année scolaire précédente, qui sont en première année du secondaire au cours de l'année scolaire en cours divisé par le nombre d'enfants étant en dernière année du primaire durant l'année scolaire précédente	86,9
7.9	ODM 3.1 Indice de parité entre les sexes (école primaire)	Taux net de fréquentation de l'école primaire (ajusté) pour les filles divisé par le taux net de fréquentation de l'école primaire (ajusté) pour les garçons	0,93
7.10	ODM 3.1 Indice de parité entre les sexes (école secondaire)	Taux de net de fréquentation de l'école secondaire (ajusté) pour les filles divisé par le taux net de fréquentation de l'école secondaire (ajusté) pour les garçons	0,78
PROTECTION DE L'ENFANT			
Enregistrement des naissances			
8.1	Enregistrement des naissances	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée sur des registres	71,7
Travail des enfants			
8.2	ODD 8.7.1 Travail des enfants	Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans qui participent au travail des enfants	31,3
Discipline de l'enfant			
8.3	Discipline violente	Pourcentage d'enfants de 1-14 ans qui ont subi des agressions psychologiques ou des châtiments corporels pendant le dernier mois	86,5
Mariage précoce et polygamie			
8.4	Mariage avant l'âge de 15 ans	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui se sont mariées avant l'âge de 15 ans (a) Femmes (b) Hommes	7,7 1,5
8.5	Mariage avant l'âge de 18 ans	Pourcentage de personnes âgées de 20-49 ans qui se sont mariées avant l'âge de 18 ans (a) Femmes (b) Hommes	32,1 4,8
8.6	Jeunes âgés de 15-19 ans actuellement mariés	Pourcentage de jeunes âgés de 15-19 ans qui sont mariés (a) Femmes (b) Hommes	18,4 1,4
8.7	Polygamie	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui sont en union polygame (a) Femmes (b) Hommes	25,6 13,9
8.8a	Différence d'âge entre conjoints	Pourcentage de jeunes femmes qui sont mariées et dont le conjoint est de 10 ans ou plus, plus âgé (a) Femmes âgées de 15-19 ans, (b) Femmes âgées de 20-24 ans	40,6
8.8b			36,0

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
Mutilation génitale féminine/excision			
8.9	Approbation de la mutilation génitale féminine/excision (MGF/E)	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui déclarent que la pratique de MGF/E doit continuer	14,0
8.10	Prévalence de la mutilation génitale féminine/excision (MGF/E) chez les femmes	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui déclarent avoir subi une forme de MGF/E	36,7
8.11	Prévalence de la mutilation génitale féminine/excision (MGF/E) chez les filles	Pourcentage de filles âgées de 0-14 ans ayant subi une forme quelconque de MGF / E, tel que rapporté par les mères âgées de 15-49 ans	10,9
Attitudes envers la violence domestique			
8.12	Attitudes envers la violence domestique	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui déclarent que le mari est en droit de frapper ou de battre sa femme dans au moins l'une des conditions suivantes: (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle se dispute avec lui, (4), elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5), elle brûle la nourriture	
		(a) Femmes	41,1
		(b) Hommes	23,5
Arrangement de vie des enfants			
8.13	Arrangement de vie des enfants	Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans ne vivant avec aucun des parents biologiques	20,2
8.14	Prévalence d'enfants avec un ou deux parents décédés	Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans avec un ou les deux parents biologiques décédés	8,6
8.15	Les enfants ayant au moins un parent vivant à l'étranger	Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans avec au moins un parent biologique vivant à l'étranger	2,7
VIH/SIDA			
Connaissance et attitudes du VIH/SIDA			
	Ont entendu parler du SIDA	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA	
		(a) Femmes	94,1
		(b) Hommes	96,2
9.1	OMD 6.3 Connaissances sur la prévention du VIH chez les jeunes	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans qui identifient correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du VIH	
		(a) Femmes	24,0
		(b) Hommes	33,0
9.2	Connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui identifient correctement les trois modes de transmission du VIH de la mère à l'enfant	
		(a) Femmes	55,2
		(b) Hommes	46,9
9.3	Attitudes bienveillantes envers les personnes vivant avec le VIH	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans exprimant des attitudes de bienveillance sur toutes les quatre questions à l'égard des personnes vivant avec le VIH	
		(a) Femmes	7,0
		(b) Hommes	15,7

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
Dépistage du VIH			
9.4	Personnes qui connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui déclarent connaître un endroit pour le dépistage du VIH (a) Femmes (b) Hommes	74,2 67,2
9.5	Personnes s'étant fait dépister pour le VIH et connaissant les résultats	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui se sont fait dépister pour le VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat (a) Femmes (b) Hommes	23,8 15,3
9.7	Conseils sur le VIH lors des soins prénatals	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années et ont reçu des soins prénatals pendant la grossesse de leur naissance la plus récente, ayant indiqué avoir reçu des conseils sur le VIH lors des soins prénatals	53,8
9.8	Test de VIH lors des soins prénatals	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années, reçu des soins prénatals pendant la grossesse de leur naissance la plus récente, et indiqué qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté un test de dépistage VIH lors des soins prénatals et reçu les résultats	60,7
Rapports sexuels à risques			
9.12	Rapports sexuels avec plusieurs partenaires	Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois (a) Femmes (b) Hommes	3,0 24,2
9.13	Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples	Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel (a) Femmes (b) Hommes	30,8 41,8
Enfants orphelins			
9.16	OMD 6.4 Ratio fréquentation scolaire orphelins sur non-orphelins	Ratio des enfants âgés de 10-14 ans scolarisés ayant perdu leurs deux parents sur les enfants âgés de 10-14 ans scolarisés dont les parents sont en vie et qui vivent avec l'un ou les deux parents	0,94
ACCÈS AUX MASS MEDIA ET À LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION/COMMUNICATION (TIC)			
Accès aux mass media			
10.1	Exposition aux médias	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio, regardent la télévision (a) Femmes (b) Hommes	4,1 9,7
Utilisation de la technologie de l'information/communication			
10.2	Utilisation d'ordinateurs	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans ayant utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois (a) Femmes (b) Hommes	14,2 29,2

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
10.3	ODD 17.8.1	Utilisation de l'internet	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois (a) Femmes 16,6 (b) Hommes 38,4
BIEN ETRE SUBJECTIF			
11.1		Satisfaction vis-à-vis de la vie	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans étant très ou assez satisfaits de leur vie, dans l'ensemble (a) Femmes 84,6 (b) Hommes 84,2
11.2		Bonheur	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans étant très ou quelque peu heureux (a) Femmes 80,6 (b) Hommes 82,5
11.3		Perception d'une vie meilleure	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée au cours de la dernière année, et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an (a) Femmes 56,9 (b) Hommes 55,3
CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL			
12.1	ODD3.a.1	Consommation de tabac	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes ou ont consommé des produits à base de tabac qui se fument ou non n'importe quand durant le mois dernier (a) Femmes 0,6 (b) Hommes 17,1
12.2		Fumer avant l'âge de 15 ans	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans ayant fumé une cigarette avant l'âge de 15 ans (a) Femmes 0,4 (b) Hommes 4,6
12.3		Consommation d'alcool	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier (a) Femmes 12,5 (b) Hommes 33,2
12.4	-	Consommation d'alcool avant 15 ans	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont bu l'alcool avant l'âge de 15 ans (a) Femmes 8,3 (b) Hommes 14,9
COHESION SOCIALE			
-	-	Niveau de tolérance	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans ayant un très niveau de tolérance (a) Femmes 46,5 (b) Hommes 60,2
-	-	Confiance en des personnes de différents groupes	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui disent avoir un haut niveau de confiance en des personnes de différents groupes (a) Femmes 21,5 (b) Hommes 27,2
-	-	Inclusion sociale	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont déclaré avoir assisté à une activité communautaire inter-ethnique (a) Femmes 23,3 (b) Hommes 27,1

